

当プログラムの略語

- 3TC : ラミブジン
- ABC : アバカビル
- AE : 有害事象
- ART : 抗レトロウイルス療法
- ARV : 抗HIV薬
- ATV : アタザナビル
- C : コビシスタット
- DHHS : 米国保健福祉省
- DOR : ドラビリン
- DRV : ダルナビル
- DTG : ドルテグラビル
- EACS : 欧州エイズ臨床学会
- EFV : エファビレンツ
- eGFR : 推定糸球体濾過率
- EVG : エルビテグラビル
- FI : 融合阻害剤
- FTC : エムトリシタビン
- FTR : fostemsavir
- IBA : ibalizumab
- INSTI : インテグラーゼ阻害剤
- NNRTI : 非核酸系逆転写酵素阻害剤
- NRTI : 核酸（ヌクレオシド）系逆転写酵素阻害剤
- PI : プロテアーゼ阻害剤
- r : 低用量リトナビル
- RAL : ラルテグラビル
- RPV : リルピビルン
- SAQ : サキナビル
- STR : 1日1回1錠レジメン
- T-20 : enfuvirtide
- TAF : テノホビルアラフェナミドフマル酸塩
- TDF : テノホビルジソプロキシシルフマル酸塩
- TPR : tipranavir
- VF : ウイルス学的失敗