

特定の臨床状況と代替レジメン

	US DHHS ¹	IAS-USA ²	EACS ³	WHO ⁴
INSTI	<ul style="list-style-type: none"> • EVG/c/TAF/FTC* • EVG/c/TDF/FTC* 	<ul style="list-style-type: none"> • DTG/ABC/3TC • EVG/c/TAF (またはTDF)/FTC* • RAL + TAF (またはTDF)/FTC • RAL + TDF/3TC 	<ul style="list-style-type: none"> • EVG/c/TAF/FTC* • EVG/c/TDF/FTC* • RAL (QDまたはBID) + ABC/3TC 	<ul style="list-style-type: none"> • DTG + ABC + 3TC • DTG + TAF + 3TC (またはFTC) • RAL + TDF + 3TC (またはFTC)
rtv (リトナビル) またはコビシスタットを併用するPI	<ul style="list-style-type: none"> • DRV/cまたはDRV/r + TAF またはTDF + FTCまたは3TC • ATV/cまたはATV/r + TAF またはTDF + FTCまたは3TC • DRV/cまたはDRV/r + ABC/3TC • DRV/r QD + 3TC 	<ul style="list-style-type: none"> • DRV/cまたはDRV/r + TAF (またはTDF)/FTC 	<ul style="list-style-type: none"> • ATV/cまたはATV/r + ABC/3TC • ATV/cまたはATV/r + TAF/FTC またはTDF/FTCまたはTDF/3TC • DRV/cまたはDRV/r + ABC/3TC 	<ul style="list-style-type: none"> • PI/r + TDF + 3TC (またはFTC)
NNRTI	<ul style="list-style-type: none"> • DOR/TDF/3TC*またはDOR + TAF/FTC • EFV (600) + TDF + (FTCまたは3TC) • EFV (400)/TDF/3TC* • EFV (600) + TAF/FTC • RPV/TDF/FTC* • RPV/TAF/FTC* 	<ul style="list-style-type: none"> • DOR/TDF/3TC*またはDOR + TAF/FTCまたはDOR + TDF/FTC • EFV (400または600) + TDF/FTCまたはTAF/FTC • RPV/TAF (またはTDF)/FTC* 	<ul style="list-style-type: none"> • DOR + TAF/FTCまたはTDF/FTCまたはTDF/3TC • DOR/TDF/3TC* • RPV + TAF/FTCまたはTDF/FTCまたはTDF/3TC • RPV/TAF/FTC* • RPV/TDF/FTC*EFV + ABC/3TC • EFV/TDF/FTC* • EFV + TAF/FTCまたはTDF/FTCまたはTDF/3TC • EFV + ABC/3TC 	<ul style="list-style-type: none"> • EFV (600) + TDF + 3TC (またはFTC) • EFV (600) + AZT + 3TC
別のレジメン	<ul style="list-style-type: none"> • DRV/rまたはDRV/c + RAL BID 		<ul style="list-style-type: none"> • DRV/rまたはDRV/c + RAL BID 	

*1日1回1錠レジメン

- 推奨事項は、併存疾患、ベースラインのHIV-1-RNA量、CD4+細胞数、CrCl、eGFR、HLA-*5701保有の有無、HBsAg検査の結果、重感染の有無及び骨粗鬆症の有無に基づき変更される場合がある。