

DHHS、IAS-USA、EACSおよびWHOの成人HIV感染者のガイドライン： 推奨される一次治療としてのARTレジメン

	US DHHS ¹	IAS-USA ²	EACS ³	WHO ⁴
INSTI	<ul style="list-style-type: none"> • BIC/TAF/FTC* • DTG/3TC* • DTG/ABC/3TC* • DTG + TAF/FTC またはTDF/FTC • RAL + TAF/FTC またはTDF/FTC 	<ul style="list-style-type: none"> • BIC/TAF/FTC* • DTG + TAF/FTC • DTG + TDF/FTC • DTG + TDF/3TC • DTG/3TC* 	<ul style="list-style-type: none"> • BIC/TAF/FTC* • DTG + 3TCまたはDTG/3TC* • DTG/ABC/3TC*またはDTG + ABC/3TC • DTG + TAF/FTCまたはTDF/FTCまたはTDF/3TC • RAL (QDまたはBID) + TAF/FTCまたはTDF/FTCまたはTDF/3TC 	<ul style="list-style-type: none"> • DTG + TDF + 3TC (またはFTC)
rtv (リトナビル) またはコビシスタットを併用するPI				
NNRTI				

*1日1回1錠レジメン

- 推奨事項は、ベースラインのHIV-1-RNA量、CD4+細胞数、CrCl、eGFR、HLA-*5701保有の有無、HBsAg検査の結果、重感染の有無及び骨粗鬆症の有無に基づき変更される場合がある。

1. US DHHS. Adult ART Guidelines. 2019 . 2. Saag M, et al. *JAMA*. 2020;324(16):1651-1669. 3. EACS Guidelines v10.1 2020. 4. WHO 2019.